

A la edad de **12 años** se administrarán **dos vacunas**, en el centro escolar durante el curso de 6º de Educación Primaria, que le protegerán frente a **dos enfermedades**:

- una vacuna contra el cáncer de cuello de útero (sólo niñas).
- una vacuna contra el Meningococo C.



Comparación de los efectos de las enfermedades y de las vacunas

Enfermedad	Efectos de la Enfermedad	Eficacia de la vacuna*	Efectos adversos
Cáncer de cuello de útero	Cáncer de cuello de útero.	98,2-100%	Dolor, induración, enrojecimiento en la zona de inyección (10%). Dolor de cabeza, náuseas, dolor en la extremidad (1-9%).
Enfermedad meningocócica C	Fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Sepsis, meningitis. Muerte (10-15% de los casos).	98%	Dolor, induración, enrojecimiento en la zona de inyección.

* Con 3 dosis, nivel de anticuerpos al mes de la última dosis




UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2016.



Papiloma

C meningokokoa



12 urterekin, bi gaixotasunetatik babes-tuko duten **bi txerto** jarriko dira ikastetxean, Lehen Hezkuntzako lehenengo mailan:

- Umetoki-lepoko minbiziaren aurkako txertoa (neskatilak bakarrik).
- C motako Meningokokoaren aurkako txertoa.



Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna	Gaixotasunaren ondorioak	Txertoaren eraginkortasuna*	Ondorio kaltegarriak
Umetoki-lepoko minbizia	Umetoki-lepoko minbizia.	%98,2-100	Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan (%10). Buruko mina, okadak, mina gorputz-adarrean (%1-9).
Gaixotasun meningokozikoa C	Sukarra, buruko mina, goragalea, okadak. Sepsia, meningitisa, heriotza (kasuen %10-15).	%98	Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan.

* 3 dosirekin, antigorputzen maila azken dositik hilabetera



CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2016



Papiloma

Meningococo C