


A la edad de **18 meses** se administrará **una vacuna** que le protegerá frente a **5 enfermedades**:

- una vacuna combinada contra Difteria, Tétanos, Tos ferina, Poliomiéлитis y Haemophilus influenzae b (Hib).



Comparación de los efectos de las enfermedades y de las vacunas

Enfermedad	Efectos de la Enfermedad	Eficacia de la vacuna*	Efectos adversos
Difteria	Problemas para respirar. Puede afectar al sistema nervioso, al corazón o a los riñones, parálisis. Muerte (6-10% de los casos).	99,8%	Dolor, induración, enrojecimiento en la zona de inyección. Fiebre, llanto, irritabilidad, pérdida de apetito (10%).
Tétanos	Espasmos musculares dolorosos, rigidez muscular, dificultad respiratoria, dificultad para tragar. Muerte (10% de los casos).	100%	
Tos ferina	Golpes de tos paroxística con dificultad para respirar. Congestión y vómitos. Neumonías, convulsiones, encefalopatías (1 caso/11.000). Muerte (0,4% en lactantes).	100%	
Poliomiéлитis	Fiebre, náuseas, vómitos, parálisis progresiva (1%). Parálisis permanente (50% de los casos hospitalizados). Muerte (5% de los casos hospitalizados).	99,3%	
Haemophilus influenzae b	Epiglotitis, osteomielitis, neumonía, meningitis. Muerte (5% de los casos de meningitis).	96,6%	

* Con 3 dosis, nivel de anticuerpos al mes de la última dosis



UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2016.




Difteria

Tetanosa

Kukutxeztula

Poliomiéлитisa

Haemophilus influenzae b



18 hilabeterekin, 5 gaixotasunetatik babestuko duten **txerto bat** jarriko zaio bisitan:

- Difteriaren, Tetanosaren, Kukurtxeztularen, PoliomiELITISAREN eta Haemophilus influenzae b-ren (Hib) aurkako txerto konbinatua.




Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna	Gaixotasunaren ondorioak	Txertoaren eraginkortasuna*	Ondorio kaltegarriak
Difteria	Arnasteko arazoak. Nerbio-sistemari, bihotzari edo giltzurrunei eragin diezaieke, paralisia. (Kasuen %6-10ean) heriotza.	%99,8	Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan. Sukarra, negarra, suminkortasuna, gose-galera (%10).
Tetanosa	Muskuluen espasmo minkorrak, muskuluen zurruntasuna, arnasteko zailtasuna, irensteko zailtasuna. (Kasuen %10ean) heriotza.	%100	
Kukurtxeztula	Eztulaldi paroxistikoa arnasteko zailtasunarekin. Kongestioa eta okadak. Pneumoniak, konbultsioak, entzefalopatiak (11.000 kasutik bat). Heriotza (bularreko haurren %0,4).	%100	
PoliomiELITISA	Sukarra, goragalea, okadak, pixkanakako paralisia (%1). Paralisi iraunkorra (ospitaleratutako kasuen %50-a). Heriotza (ospitaleratutako kasuen %5-a).	%99,3	
Haemophilus influenzae b	Epiglotitisa, osteomiELITISA, pneumonia, meningitisa, heriotza (meningitis kasuen %5).	%96,6	

* 3 dosirekin, antigorputzen maila azken dositik hilabetera



CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2016



Difteria

Tétanos

Tos ferina

PoliomiELITIS

Haemophilus influenzae b